

Gebruuchsinformatiön VIRUMOR (Wirkstoff: Kaliumperoxymonosulfat)	de	en	fr	es	nl	sv	da	fi
Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller Aquarium Münster Pahlsmeyer GmbH Galgheide 8 D-48291 Telgte (Germany) Bezeichnung des Arzneimittels VIRUMOR Pulver für Zierfische, Wirkstoff: Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat) Anwendungsgebiete Arzneimittel gegen bakterielle Infektionen (Aeromonas, Pseudomonas, Streptokokken, Columnaris, u. A.), Viruserkrankungen und Pilzinfektionen (Saprolegnia, Achlya) von Zierfischen im Süß- und Meerwasser. Symptome für solche Infektionen sind Veränderungen wie Verlust von Haut und Schuppen, Schwellungen, Aufbrüche bis zu kraterartigen Vertiefungen, Wunden mit und ohne Rötungen des umliegenden Gewebes, Geschwüre, Flossenfraß, Verlangsamung der Beschleunigung der Bewegungen, Torkeln, Verkrampfen, allgemeines Nachdunkeln, aufgetriebene Bäuche mit gesträubten Schuppen, watteartige, bauschige Beläge. Gegenanzeigen und Nebenwirkungen Keine bekannt. Sollten Sie Nebenwirkungen bei Ihren Zierfischen feststellen, so informieren Sie bitte Ihren Tierarzt oder Apotheker. Tierart, für die das Arzneimittel bestimmt ist Zierfische Dosierungsanleitung für jede Tierart, Art und Weise der Anwendung 1. Dauerbad-Behandlung: Über 7 Tage täglich 500 mg VIRUMOR je 100 l Wasser lösen und die Lösung gleichmäßig im Aquarium bzw. Gartenteich verteilen. Während der Behandlung nur geringe Mengen füttern. Zeigen sich noch Krankheits Symptome, kann die Behandlung nach einer Wartezeit von einem Tag wiederholt werden. 2. Kurzbad-Behandlung: 500 mg VIRUMOR je 10 l Wasser lösen und die Fische 3 Stunden in dieser Lösung baden. Während der Behandlung gut belüften und die Fische aufmerksam beobachten. Bei Auftreten von Unverträglichkeiten Behandlung abbrechen. Die Behandlung kann täglich, im Abstand von 24 Stunden, bis zu einer Woche lang wiederholt werden. 3. Desinfektionsbad: Zur Vorbeugung, bei neu erworbenen Zierfischen und zur Desinfektion von neu erworbenen Wasserpflanzen, Dekorationsgegenständen, o. Ä. ist ein Desinfektionsbad zu empfehlen. 500 mg VIRUMOR in 10 l Wasser lösen und die Fische, Pflanzen oder Dekorationsgegenstände 30 Minuten in dieser Lösung baden. 4. Regelmäßige Vorbeugung: Zur regelmäßigen Vorbeugung kann die wöchentliche Gabe von 100 mg je 100 l Wasser den Infektionsdruck deutlich reduzieren und das Risiko einer Infektion reduzieren. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung - VIRUMOR vor Licht und Feuchtigkeit schützen. In der Originalverpackung lagern. - Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Besondere Warnhinweise - Es liegen keine Erfahrungen mit Wirbellosen vor. Wirbellose (Schnecken, Muscheln, Garnelen, Korallen, etc.) müssen von der Behandlung ausgeschlossen werden. - Für Zierfische. Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen. - VIRUMOR darf nicht gleichzeitig mit anderen Mitteln verwendet werden. - Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung von nicht verwendeten Arzneimitteln Nicht aufgebrauchte Arzneimittel bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Datum der letzten Überarbeitung der Packungsbeilage 2021-08-01	Pharmaceutical company and manufacturer Aquarium Münster Pahlsmeyer GmbH Galgheide 8 D-48291 Telgte (Germany) Name of the pharmaceutical product VIRUMOR Powder for ornamental fish, active agent: potassium peroxymonosulphate Applications Medication for ornamental freshwater and marine fish for the treatment of bacterial infections (Aeromonas, Pseudomonas, Streptococcus, Columnaris, etc.), viral diseases and fungal infections (Saprolegnia, Achlya). Various changes are symptomatic of these infections, such as loss of skin and scales, swelling, areas of surface cracking to deep pitting, open sores with and without reddening of the surrounding tissue, ulcerous growths, frayed fins, lethargic or frenzied movements, lurching movements, spasms, general darkening, distended abdomen with protruding scales, cotton wool-like deposits in tufts. Contraindications and side effects No known contraindications or side effects. Should you notice side effects in your ornamental fish, please inform your vet or pharmacist. Species, for which the medication is intended Ornamental fish Dosage for each species, type and duration of application 1. Long-term bath treatment: Dissolve 500 mg of VIRUMOR for every 100 l of water and then stir to distribute it evenly in the aquarium or garden pond daily for 7 days. Only feed small amounts during the treatment. If symptoms persist, then treatment can be repeated after waiting for one day. 2. Short-term bath treatment: Dissolve 500 mg of VIRUMOR for every 10 l of water and leave the fish to bathe in this solution for 3 hours. Provide adequate ventilation during the treatment and keep the fish under close observation. Stop the treatment if there are signs of intolerance. This treatment can be repeated daily at intervals of 24 hours up to one week long. 3. Disinfection bath: A disinfection bath is advisable as a precautionary measure for newly acquired ornamental fish and for newly acquired aquatic plants and decorative objects, etc. Dissolve 500 mg of VIRUMOR in 10 l of water and leave the fish, plants or decorative objects to bathe in this solution for 30 minutes. 4. Regular preventive action: For regular prevention, the weekly addition of 100 mg for every 100 l of water can reduce the infection pressure considerably and reduce the risk of an infection. Special precautions for storage - Keep VIRUMOR in a dry, dark place. Store in its original packaging. - Keep out of reach of children. Special warnings - No records are available on the use of the product with invertebrates. Invertebrates (snails, mussels, shrimps, corals, etc. must be excluded from the treatment. - For ornamental fish. Do not administer to creatures which are used for human consumption. - VIRUMOR may not be used in conjunction with other products. - Do not use after the use-by date has expired. Special precautions for the disposal of unused pharmaceuticals Take unused medical products and unfinished containers of medical products to the designated collection points. Date of last revision of package insert 2021-08-01	Informations d'utilisation du VIRUMOR (principe actif : peroxymonosulfate de potassium) Entrepreneur et du fabricant pharmaceutiques Aquarium Münster Pahlsmeyer GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte (Allemagne) Désignation du médicament Poudre VIRUMOR pour poissons d'ornement, principe actif : peroxymonosulfate de potassium Domaines d'application Médicament contre les infections bactériennes (Aeromonas, Pseudomonas, streptocoques, Columnaris, etc.), les maladies virales et les infections fongiques (saprolegniose, infection de type Achlya) des poissons d'agrément d'eau douce et d'eau de mer. Les symptômes de telles infections sont des modifications telles que : perte de peau et d'écaillés, enflures, gerçures pouvant prendre la forme de cratères, plaies avec ou sans rougeurs des tissus avoisinants, ulcères, érosion des nageoires, ralentissement ou accélération des mouvements, mouvements titubants, crampes, assombrissement général, ventres gonflés avec écailles hérissées, des plaques d'aspect cotonneux formant des boursouflures. Contre-indications et effets secondaires Aucune contre-indication et aucun effet secondaire ne sont connus. Au cas où vous constateriez toutefois des effets secondaires sur vos poissons d'agrément, veuillez informer votre vétérinaire ou votre pharmacien. Espèce animale à laquelle le médicament est destiné Poissons d'ornament Posologie pour chaque espèce, type et durée d'application 1. Bain de traitement continu : Pendant 7 jours, dissoudre chaque jour 500 mg de VIRUMOR pour 100 l d'eau et et répartir régulièrement cette solution dans l'aquarium ou le bassin de jardin. Ne nourrir les poissons que par petites quantités pendant le traitement. Si des symptômes de maladie persistent, le traitement peut être répété après une attente d'une journée. 2. Bain de traitement court : Dissoudre 500 mg de VIRUMOR dans 10 l d'eau et baigner les poissons dans cette solution pendant 3 heures. Ventilair bien durante el tratamiento, prendre soin de bien aérer et observer attentivement daily at intervals of 24 hours up to one week long. 3. Désinfection bath: A disinfection bath is advisable as a precautionary measure for newly acquired ornamental fish and for newly acquired aquatic plants and decorative objects, etc. Dissolve 500 mg of VIRUMOR in 10 l of water and leave the fish, plants or decorative objects to bathe in this solution for 30 minutes. 4. Régular preventive action: For regular prevention, the weekly addition of 100 mg for every 100 l of water can reduce the infection pressure considerably and reduce the risk of an infection. Précautions particulières à prendre pour le stockage - Protéger VIRUMOR de la lumière et de l'humidité. Stocker dans l'emballage d'origine. - Conserver hors de la portée des enfants. Consignes particulières - On ne dispose d'aucune expérience concernant les invertébrés. Les invertébrés (escargots, coquillages, crevettes, coraux, etc.) doivent être exclus du traitement. - Pour poissons d'agrément. Ne pas utiliser sur animaux destinés à l'alimentation. - VIRUMOR ne doit pas être utilisé avec d'autres produits. - Do not use after the date limite d'utilisation. Précautions particulières à prendre pour l'élimination de médicaments non utilisés Remettre les médicaments non utilisés aux points de collecte prévus à cet effet. Date de la dernière révision de la notice 2021-08-01	Empresa farmacéutica y fabricante Aquarium Münster Pahlsmeyer GmbH Galgheide 8 D-48291 Telgte (Alemania) Denominación del medicamento VIRUMOR polvo para peces ornamentales, sustancia activa: monosulfato peróxido potásico Ámbitos de aplicación Medicamento contra infecciones bacteriales (aeromonas, pseudomonas, estreptococos, columnaris, e.o.), enfermedades virales e infecciones de hongos (saprolegnia, aclia) de peces de acuario de agua dulce y salada. Los síntomas de dichas infecciones se presentan como pérdida de piel y de escamas, desde abscesos hasta hendiduras en forma de cráter, heridas con y sin enrojecimiento del tejido circundante, llagas, podredumbre de las aletas, ralentización o aceleración de los movimientos, tambaleos, convulsiones, oscurecimiento general, abdómenes hinchados, con escamas encrespadas, recubrimientos algodonosos absolados. Contraindicaciones y efectos secundarios Se desconocen. Si se observan efectos secundarios en los peces de acuario, consulte a su veterinario o farmacéutico. Clase de animal a las que se destina el medicamento Peces de acuario Dosis para cada especie, tipo y duración de aplicación 1. Tratamiento de baño permanente: Disolver diariamente 500 mg de VIRUMOR por cada 100 l de agua durante 7 días y repartir la solución homogéneamente en el acuario o el estanque de jardín. Durante el tratamiento, alimentar a los peces solamente en pequeñas cantidades. Si siguen presentando síntomas de enfermedad, se puede repetir el tratamiento pasado un día. 2. Tratamiento de baño corto: Disolver 500 mg de VIRUMOR por cada 10 l de agua y poner los peces en esta solución durante 3 horas. Ventilar bien durante el tratamiento y observar atentamente a los peces. Si se presentaran incompatibilidades, interrumpir el tratamiento. El tratamiento puede repetirse diariamente a intervalos de 24 horas durante una semana como máximo. 3. Baño desinfectante: Como prevención a la hora de adquirir nuevos peces de acuario y para la desinfección de nuevas plantas acuáticas, objetos decorativos o similares, se recomienda realizar un baño desinfectante. Disolver 500 mg de VIRUMOR en 10 l de agua y poner los peces, plantas u objetos decorativos en esta solución durante 30 minutos. 4. Prevención periódica: Una prevención periódica con una dosis semanal de 100 mg por cada 100 l de agua puede reducir considerablemente el número de patógenos y por consiguiente el riesgo de infección. Medidas de precaución extraordinarias para la conservación del producto - Proteger VIRUMOR de la luz y la humedad. Guardar en el embalaje original. - Mantener fuera del alcance de los niños. Advertencias especiales - No existen experiencias con invertebrados. Excluir a los invertebrados (caracoles, almejas, gambas, corales, etc.) del tratamiento. - Para peces de acuario. No utilizar en animales destinados al consumo humano. - VIRUMOR no debe utilizar simultáneamente con otras sustancias. - No utilizar una vez vencida la fecha de caducidad. Medidas de precaución especiales para la eliminación de medicamentos no utilizados Entregar los medicamentos no consumidos en los lugares de recogida correspondientes. Última revisión de la documentación adjunta 2021-08-01	Gebrauchsinformatie VIRUMOR (werkzame stof: kaliumperoxymonosulfaat) Farmaceutische ondernemer en fabrikant Aquarium Münster Pahlsmeyer GmbH Galgheide 8 D-48291 Telgte (Duitsland) Benaming van het medicijn VIRUMOR poeder voor sierfissen, werkzame stof: kaliumperoxymonosulfaat Toepassingsgebieden Medicijn tegen bacteriële infecties (Aeromonas, Pseudomonas, streptokokken, Columnaris e.a.), virusinfecties en schimmelinfecties (Saprolegnia, Achlya) van siervissen in zoet en zeevater. Symptomen voor dergelijke infecties zijn veranderingen zoals verlies van huid en schubben, zwellingen, barstjes tot kraterachtige kuiltjes, wonden met en zonder roodgekleurd weefsel rond de wond, zweren, weefselafbraak aan de vinnen, verlangzaming of bespoediging van de bewegingen, waggelen, verkrampen, donkere kleur, gezwollen buikjes in combinatie met opgezette schubben, wattenachtige aanslagen. Contra-indicaties en bijwerkingen Geen bijwerkingen bekend. Informeer, als u bijwerkingen bij uw siervissen constateert, a.u.b. uw dierenarts of apotheker. Diersoort waarvoor het geneesmiddel is bedoeld Siervissen Dosering voor elke soort, type en duur van de toediening 1. Langdurige badbehandeling Gedurende 7 dagen dagelijks 500 mg VIRUMOR per 100 l water oplossen en de oplossing vervolgens gelijkmatig in het aquarium of de tuinvijver verdelen. Tijdens de behandeling slechts geringe hoeveelheden voeren. Wanneer nog steeds ziektesymptomen voorhanden zijn, kan de behandeling na een wachttijd van één dag worden herhaald. 2. Korte badbehandeling 500 mg VIRUMOR per 10 l water oplossen en de vissen gedurende 3 uur in deze oplossing baden. Tijdens de behandeling goed beluchten en de vissen goed observeren. Stop de behandeling wanneer de vissen de behandeling niet verdragen. De behandeling kan dagelijks tot een week lang worden herhaald met tussenpauzen van 24 uur. 3. Desinfectiebad Preventief bij nieuwe siervissen en als desinfectie van nieuwe waterplanten, decoratievoorwerpen e.d. adviseren wij een desinfectiebad. 500 mg VIRUMOR in 10 l water oplossen en de vissen, planten of decoratievoorwerpen gedurende 30 minuten in deze oplossing baden. 4. Regelmatige preventieve behandeling Als regelmatige preventie kan de wekelijkse toevoeging van 100 mg per 100 l water de infectiedruk aanzienlijk verminderen en het risico van een infectie terugdringen. Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor de opslag - VIRUMOR tegen licht en vocht beschermen. In de originele verpakking bewaren. - Buiten het bereik van kinderen bewaren. Bijzondere waarschuwing - Er zijn nog geen ervaringen met ongewervelde dieren. Ongewervelde dieren (slakken, mosselen, garnalen, korallen enz.) moeten van de behandeling worden uitgesloten. - Voor siervissen. Niet gebruiken voor dieren die bedoeld zijn voor de winning van levensmiddelen. - VIRUMOR mag niet tegelijk met andere middelen worden toegeediend. - Niet meer gebruiken na afloop van de vervaldatum. Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor de afvoer van niet-verbruikte medicijnen Geef niet-verbruikte medicijnen af bij de dienovereenkomstige inzamelpunten. Datum van de laatste herziening van de bijsluiter 2021-08-01	Bruksinformatie VIRUMOR (verksamt ämne: kaliumperoxymonosulfat) Namn och adress för läkemedelsfirma och tillverkare Aquarium Münster Pahlsmeyer GmbH Galgheide 8 D-48291 Telgte (Tyskland) Beteckning för läkemedlet VIRUMOR pulver för prydnaðsfisk, verksamt ämne: kaliumperoxymonosulfat Användningsområden Läkemedel mot bakteriella infektioner (aeromonas, pseudomonas, streptokocker, columnaris bl. a.), virusjukdomar och svampinfektioner (saprolegnia, achlya) hos akvariefiskar i söt- och havsvatten. Symptom för sådana infektioner är förändringar som förlust av hud och fjäll, svullnader, sprickor ända till kraterliknande fördjupningar, sår med och utan rodnad av den kringliggande vävnaden, bölder, fenröta, långsammare eller snabbare rörelser, osäkra rörelser, krampor, allmän mörkfärgning, uppsvällda bukar med uppresta fjäll, vaddliknande pösig beläggning. Kontraindikationer och biverkningar Inga kända. Skulle du fastställa biverkningar hos dina akvariefiskar, ska du informera din veterinär eller apotekare. Djurarter för vilka läkemedlet är avsett Akvariefiskar Doseringsanvisningar för varje art, sätt för applicering 1. Behandling med permanentbad: Lös under 7 dagar dagligen upp 500 mg VIRUMOR per 100 l vatten och fördela lösningen jämnt i akvariet resp. trädgårdsdammen. Utfodra bara mindre mängder under behandlingen. Visar sig fortfarande sjukdomssymptom kan behandlingen upprepas efter en väntetid på en dag. 2. Behandling med kort bad: Lös upp 500 mg VIRUMOR i 10 l vatten och låt fiskarna bada 3 timmar i denna lösning. Lufta ordentligt under behandlingen och observera fiskarna uppmärksam. Avbryt behandlingen om fiskarna visar tecken på att inte tåla den. Behandlingen kan upprepas dagligen upp till en vecka med ett intervall på 24 timmar. 3. Desinfektionsbad: Ett desinfektionsbad rekommenderas som förebyggande behandling av nyförvärvade akvariefiskar och som desinfektion av nyförvärvade vattenväxter, dekorationsföremål och liknande. Lös upp 500 mg VIRUMOR i 10 l vatten och låt fiskarna, växterna eller dekorationsföremålen bada 30 minuter i denna lösning. 4. Regelbunden profylax: För regelbunden förebyggande behandling kan den veckovisa doseringen med 100 mg per 100 l vatten reducera infektionstrycket markant och minska risken för en infektion. Speciella försiktighetsåtgärder för förvaringen - Skydda VIRUMOR för ljus och fuktighet. Förvara i originalförpackningen. - Förvaras öatkomligt för barn. Speciella varningar - Det föreligger ingen erfarenhet med ryggradslösa. Ryggradslösa (snäckor, musslor , räkor, koraller etc.) måste uteslutas från behandlingen. - För akvariefiskar. Får inte användas för djur, som tjänar till framställande av livsmedel. - VIRUMOR får inte användas samtidigt med andra medel. - Skall inte användas sedan förfallsdatum gått ut. Speciella försiktighetsåtgärder för undanröjandet av ej använda läkemedel Lämnä läkemedel som ej förbrukats på för detta avsedda uppsamlingsställen. Datum för sista omarbetningen av bipacksedeln 2021-08-01	Brugerinformation VIRUMOR (virkestof: kaliumperoxymonosulfat) Den farmaceutiske virksomheds og producentens navn og adresse Aquarium Münster Pahlsmeyer GmbH Galgheide 8 D-48291 Telgte (Tyskland) Medikamentets betegnelse VIRUMOR pulver til prydñsfisk, virkestof: kaliumperoxymonosulfat Anvendelsesområder Medikament mod bakterielle infektioner (aeromonas, pseudomonas, streptokokker, columnaris, og andre), virusygdomme og svampeinfektioner (saprolegnia, achlya) hos hos prydñsfisk i fersk vand og havvand. Symptomer på sådanne infektioner viser fisk forandringer som tab af hud og skæl, hævelser, revner hen til kraterlignende fordybninger, sår med og uden rødfarvning af det omliggende væv, knuder, rådrende finner, langsommere eller hurtigere bevægelser, slingren, forkrampninger, almen mørkhed, oppustede maver med strittende skæl, vatlignende, klumpede belægninger. Modindikationer og bivirkninger Ingen kendt. Hvis du fastslår bivirkninger hos dine prydñsfisk, bedes du meddele det til din dyrlæge eller apoteker. Dyreart for vilka lækemedlet är avsett Prydfisk Doseringsinstruktioner for hver art, anvendelsesmåde 1. Varig bad-behandling: Opløs hver dag i en periode på 7 dage 500 mg VIRUMOR pr. 100 l vand og fordel opløsningen jævnt i akvariet eller i havedammen. Under behandling må der kun tilføres foder i lav mængde. Hvis der stadig er sygdomssymptomer efter de syv dage, kan behandlingen gentages med en dags pause. 2. Korttids bad-behandling: Opløs 500 mg VIRUMOR pr. 10 l vand, og fiskene bades i 3 timer i denne opløsning. Under behandlingen skal der udluftes godt, og fiskene skal iagttages opmærksomt. Hvis der forekommer overfølsomhed, skal behandlingen afbrydes. Behandlingen kan gentages dagligt med 24 timers interval i op til en uge. 3. Desinfektionsbad: Til forebyggelse ved nyhvervede prydñsfisk og til desinfektion af nyhvervede vandplanter, dekorationsgenstande og lign. anbefales et desinfektionsbad. 500 mg VIRUMOR opløses i 10 l akvarievand, og fiskene, planterne eller dekorationsgenstandene bades i 30 minutter i denne opløsning. 4. Regelmæssig forebyggelse: Til regelmæssig forebyggelse kan en ugentlig tilførsel af 100 mg pr. 100 l vand reducere infektionstrykket betydeligt og dermed reducere risikoen for en infektion. Særlige forsigtighedsforholdsregler for opbevaringen - VIRUMOR skal beskyttes mod lys og fugtighed. Skal opbevares i den originale emballage. - Skal opbevares utilgængeligt for børn. Særlige advarselshenvisninger - Der foreligger ingen erfaringer med hvirvelløse dyr. Hvirvelløse dyr (snegle, muslinger, rejjer, koraller m.m.) skal udelukkes fra behandlingen. - Til prydñsfisk. Må ikke anvendes til dyr, som tjener til produktion af levnedsmidler. - VIRUMOR må ikke bruges samtidig med andre midler. - Må ikke anvendes efter forfaldsdatoens udløb. Særlige forsigtighedsforholdsregler for bortskaffelsen af ikke benyttede medikamenter Medikamenter, som ikke er opbrugt, skal afleveres på de tilsvarende indsamlingssteder. Dato for sidste revision af vedlægsedlen 2021-08-01	VIRUMOR-käyttötiedote (vaikuttava aine: kaliumperoksimonosulfaatti) Lääkeyrityksen ja valmistajan nimi ja osoite Aquarium Münster Pahlsmeyer GmbH Galgheide 8 D-48291 Telgte (Saksa) Lääkeaineen nimi VIRUMOR-jauhe koristekaloille, vaikuttava aine: kaliumperoksimonosulfaatti Käyttötarkoitus Lääkeaine makean ja suolaisen veden koristekalojen bakteeritulehdusten (Aeromonas, Pseudomonas, streptokokit, Columnaris yms.), virustautien ja sienitulehdusten (Saprolegnia, Achlya) torjuntaan. Tällaisten tulehdusten oireita ovat muutokset kuten ihokudoksen ja suomujen menetyt, turpoamat, jopa kraaterimaisten syvennysten kaltaiset repeytyvät, haavat, joita ympäröivä kudot punoittaa tai ei punoita, haavaumat, evämätä, liikkeiden hidastuminen tai kihtyminen, hoippuminen, kouristuminen, yleinen tummuminen, paisuneet vatsat porhistynein suuvin, pumpullimaiset, pöyheät peitteet. Vasta-aiheet ja sivuvaikutukset Ei tunnettuja sivuvaikutuksia. Mikäli havaitset koristekaloissasi sivuvaikutuksia, ilmoita niistä eläinlääkärillesi tai apteekkiin. Eläinlajit, joille lääke on tarkoitettu Koristekalat Annostusohjeet kullekin lajille, käyttötapa 1. Kestokylpyhoito: Liuita seitsemän päivän ajan päivittäin 500 mg VIRUMOR:ia 100 litraan vettä ja jaa liuos tasaisesti akvaarioon tai puutarhalammikkoon. Ruoki hoitokäsittelyn aikana vain pienillä määriillä. Mikäli sairautsoireita esiintyy edelleen, hoitokäsittely voidaan toistaa yhden päivän odotusajan jälkeen. 2. Lyhyt kylpyhoito: Liuita 500 mg VIRUMOR:ia 10 litraan vettä ja kylvetä kaloja 3 tuntia liuoksessa. Ilmasta hyvin hoitokäsittelyn aikana ja pidä kaloja tarkasti silmällä. Jos huomaat, että kalat eivät siedä ainetta, keskeytä hoitokäsittely. Käsittely voidaan toistaa päivittäin, 24 tunnin välein, enintään viikon ajan. 3. Desinfiointikylpy: Ennaltaehkäiseväksi käsittelyksi uusille koristekaloille ja uusien vesikasvien, koristeiden tms. desinfiomiseksi on suositeltavaa käyttää desinfioivaa kylpyä. Liuita 500 mg VIRUMOR:ia 10 litraan vettä ja kylvetä kaloja, kasveja tai koristeita 30 minuuttia liuoksessa. 4. Säännöllinen ennaltaehkäisy: Säännölliseksi ennaltaehkäisyksi annettava viikottainen 100 mg:a 100 litraan vettä vähentää infektiopainetta huomattavasti ja vähentää infektiöriskiä. Erityiset varotoimenpiteet säilytystä varten - VIRUMOR on suojattava valolta ja kosteudelta. Säilytettävä alkupeäispakkauksessa. - Säilytettävä poissa lasten ulottuvilta. Erityisiä varoituksia - Selkärangattomista ei ole saatu kokemuksia. Selkärangattomat (etanat, simpukat, katkaravut, korallit ym.) on jätettävä hoitokäsittelyn ulkopuolelle. - Koristekaloille. Ei saa käyttää eläimille, joita käytetään elintarvikkeiden tuotantoon. - VIRUMOR ei saa käyttää samaan aikaan muiden aineiden kanssa. - Älä käytä enää pakkauksen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Erityiset varotoimenpiteet käyttämättömien lääkkeiden poistamiseksi Lääkkeet, joita ei ole käytetty loppuun, on vietävä vastaaviin keräilypisteisiin. Päivämäärä, jolloin tätä pakkaukselostetta on viimeksi muutettu 2021-08-01	

